

2021年06月11日

[HPV ワクチンの案内 結局どうすればいいの？ 20210610](#)

HPV ワクチン(子宮頸がんワクチン)についての案内が対象者向けに行政から送付されてるようです

いままで、HPV ワクチン裁判、マスコミ報道によっていろいろと報道があり、
定期接種ではあるが積極的に勧奨しない という不思議な状態でした
詳しい経緯は、村中璃子氏の「10万個の子宮」平凡社にも詳しく述べられています

最近ようやく、行政からもワクチンの案内を対象者向けに送付するようになりました

しかし、最後の部分を読むと結局受けたら良いのどうなの？という感じです
～「接種をおすすめするお知らせをお送りするのではなく、希望される方が接種を受けられるよう、みなさまに情報をお届けしています」～

[厚労省からの概要版](#)

もしも接種対象者の方で、接種に迷いが生じたなら、先の「10万個の子宮」もしくは漫画コウノドリ「13-14巻」を読んでみてはどうでしょう
～クリニックに貸し出し用、何冊かおいてあります～

ただ接種対象年齢には期限があるため、そんなに時間かけられないという場合もあります
～迷っている間に定期接種対象外～
こちらでは次のようなパンフレットでDT(DPT)接種にこられた小学6年女子と保護者に説明しています

ぬちぐすいみみぐすいより、「接種勧奨再開」を期待～県内の産婦人科医師

「接種勧奨」再開を期待

金城忠雄 県健康づくり財団(南風原町)

命ぐすい 耳ぐすい

日本・沖縄産婦人科学会では子宮頸がん予防ワクチンHPVワクチン接種再開し、現在、厚生労働省に「積極的接種勧奨」再開を求めてシンポジウムを開き、国民・県民には積極的接種活動を行っています。

1983年に子宮頸がんの原因は「人乳头腫瘍ウイルス(HPV)」であることが明らかに became. 検査方法も子宮頸部の塗抹の細胞診に加え、HPVの有無を検査することが勧められています。HPVワクチンも開発され、世界的には2006年に接種可能となり、日本でも2010年に承認されました。接種対象は、HPVウイルスに感染していないと思われる

子宮頸がん予防ワクチン

▷▷ 1203



11歳(小6)から16歳(高一)までの女子生徒です。

とて、予防接種が一般的に皮下注射であること比べ、HPVワクチンは筋肉内への接種のため、疼痛が強く思春期の女の子に恐怖感を与えました。接種後の、広範囲にわたる疼痛や体調不良などの症状が大きな問題になりました。HPVワクチン接種による健康被害が深刻問題になり、2013年、国は「積極的な接種勧奨の差し控え」を決定しています。その結果、


沖縄県保健医療部の報告では、公費補助によるHPVワクチン接種が、2011年は3万4444人でしたが、2018年には68人に激減しています。

沖縄県の子宮頸がん状況は、1年間に志保内がんも含め458人が初発治療し、死亡数47人に達して、大腸がん、乳がんに次ぐ大きな数字です。子宮頸がんはHPVワクチンで予防できることが分かっているのです。親が娘に子宮頸がんになってほしくないと思うのは当然です。HPVワクチン接種時の疼痛に対し、思春期の少女の痛みの恐怖心を和らげるには、親の愛情とワクチン接種する医師の丁寧な説明、優しい看護士さんのケアが必要かと頭を悩ませています。

日本・沖縄産婦人科学会は、厚生労働省が、HPVワクチン開発について、正しい情報を伝え、「積極的接種勧奨再開」を促すことを期待しています。婦人科専門医として、子宮頸がん患者の死亡がなくなることを願っています。

2030年日本のみが子宮頸がん患者3倍

1990年から2012年までのHPVに起因するがん発生率の比較と2030年までの予測(5大国) 世界的にはわずかながら有意に減少傾向。 ところが、アジアでは「ある国」だけが、29%増加。 20210517



りえさん手帳 知識は鎧より

20201219

子宮頸がんワクチンのこと



わかりやすいパンフレット、富山県より

大人になる前のあなたに・・・ 大切なワクチンがあります

若い女性に子宮頸がんが増えています

- 毎年約1万人の女性が子宮頸がんにかかり、約3000人が命を失っています。
- とくに、妊娠・出産を考える20～40年代でかかる人が増えています。

子宮頸がんの10万人あたり人数
(2014年 国立がん研究センター)



子宮頸がんの原因は ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染です

性交渉によりHPVに感染
(機会があれば何歳でも感染)



- 性交渉により8割の女性がHPVに感染します。自然に排除されることが多いのですが、生涯で全女性の約73人に1人が子宮頸がんにかかります。(国立がん研究センター)
- 子宮頸がんは予防と早期発見が必須です。
①子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン) 予防できるのはワクチンのみです!
②子宮頸がん検診 早期発見・早期治療にとっても重要です。

ワクチンのデメリット (副反応の可能性)

- HPVワクチンには以下の副反応があります。
- 一時的な副反応として注射部位の腫れ・痛み・発熱・ふらつきなどが起こることがあります。
- 副反応の可能性として広範な痛みや様々な身体症状(神経性身体症状)が報告されています。
[腫れなくても肉腫の症状が疑える人がほとんどいないことがわかっており、悪化リスクは低いです。]

VS

ワクチンのメリット (子宮頸がん予防効果)

- HPVワクチンで子宮頸がんの6～7割が予防可能です。
- HPVワクチンを12～13歳で接種している世界各国で、その後の子宮頸がんにかかる女性が減少しています。
- 最近日本でも、接種者より接種者の方が子宮頸がん検診での異常が52～88%減少したと報告されています。(2016 秋報)

ワクチンをよく知って接種しましょう

- HPVワクチンは、定期予防接種として小6～高1の女性は無料で接種できます。
(※春学期後半、もしくはお近くの小児科・産婦人科へお問い合わせください)
- 接種の費用については、保護者だけでなくご本人にもご理解いただくことが大切です。かかりつけ医とよくご相談の上、接種されることをお勧めします。
- 各一の副反応への医療体制を整っております。(富山県は富山大学附属病院)
- HPVワクチンに関する情報は右側のQRコードでもご覧いただけます。



富山県産科検診会・富山県産婦人科医会・富山県小児科医会

2018年04月09日

講演会メモ「10万個の子宮」村中璃子先生 2018年4月8日

講演会メモ「10万個の子宮」医師・ジャーナリスト 村中璃子先生

2018/04/08 外来小児科学会春季特別講演、東京国際フォーラム

村中先生

日本人で初めてジョンマドックス賞受賞

困難や敵意にアイながらも、公共の利益のためにサイエンスを世に広めた人物に与えられる賞、マスコミがこの快挙を報じないことが、海外でも驚きをもってニュースとなった

タイトル、10万個の子宮

日本では毎年、子宮頸がんによって3000人の命と1万の子宮が失われている

現在裁判がおこされ定期接種が、積極的には勧められてない状態

裁判が結審するまで約10年(接種再開を決断できる首相や官僚は出ないだろう)

1万×10年=10万個の子宮を日本の産婦人科医は彫り続けれることになる

ある講演会での衝撃的な質問

「僕たち日本人の医者だけ、あとどのくらい子宮を掘り続ければいいんですか？」

「ワクチンがあるのに使われていないことは本当に残念です。でも、この問題を口にするのは憚られます。」

HANS: 治ってもまたかかる？ 標準治療がステロイドパルス、血漿交換、子どもに認知症の治療薬、脊髄。硬膜外に電極、代替え治療、川島なお美さんもうけたビタミンパルス、、、など。ワクチンがダメで、この様に侵襲的な治療はOK？、子どもたち守る必要ある

身体表現障害: こどもたちに寄り添うことが必要、気のせいだとしない、

英国: ウエーバー効果、新しいワクチン導入後、2年間は有害事象多い

オーストラリア: 2012-13 男子も接種スタート、22.7%のHPV感染率が現在1.1%となった

20年以内に子宮頸がんがゼロになる予想

WHO: 15才以下、初回のHPVワクチン接種を2回でOKと変更(0-6ヶ月)

15歳以上、0、1-2ヶ月、6ヶ月の3回

日本、未だに3回接種(一度決めたら、変更しない、、、のはおかしい)

CDC アメリカ、15歳以下、初回では2回接種(2016年10月から)

いまでは、9価の新しいワクチン承認

サーバリックス(2価)、ガーダシル(4価)を1-2回接種している場合は9価

を1回接種で OK として、データまだないが CDC は推奨
初回が1本のみ接種の場合、CDC 速やかに9価を1本接種としている
名古屋市子宮頸がん、中間報告 2015/12/14 HP から削除されてしまった
最終報告がない、情報開示請求したら、、、
最終結論 ワクチンをしている群とそうでない群「有意差がない」
オッズ比 1.0 以下
薬害に詳しい河村市長、、、薬害でないなら興味ない

薬害のサリドマイドのオッズ比は→ 380
白木 4 原則(医学と法律の谷間を埋めるものさし)
2016/11/15NEWS23 報道、
修正実験なし(信州大学)、生データ出してほしいが出さない
2017/04 厚労省 3 年計画を更新、いまだに池田班はずしてない
守れる命を守る会

ジョンマドックス賞:
国を挙げての反ワクチンキャンペーン、国もメディアも反ワクチン運動にコントロールされた異常事態

1998 年ランセット、MMR ワクチンと自閉症、アンドリューウェイクフィールドの捏造
接種率が 90%を超えるまでに 8 年かかった

日本 60-70%あった HPV ワクチンの接種率、現在 1%以下、海外で質問された、これはなにかの間違いか？と

身体性表現障害の子ども達の不安を正面から受け止める、
ワクチンのせいになれば楽だが、、、もっと心のことも診てほしい
検査で異常なくても、、、ケアしてほしい、異常なければ医師から「安心しろ治る」とはっきりいってあげることが大切、必要な子にはリハビリ、ケア

アイルランドでの対応: 理不尽な訴えも無視しないで受け止める、ときには反論する、放置しない

村中璃子氏の最新記事は note で見れる
文系女医の書いて、思うこと。 応援用: 月額 3,000 円
(現在名誉毀損で裁判をおこなわれている、皆さんの支援をお願いします)
子宮頸がんワクチンを接種できる医療機関の登録もしています
(どこで HPV ワクチン接種できますか? という問い合わせ増えつつあり)

~~~~~

聡明、芯の太い、気骨のある、(女性ですが)益荒男、

村中さんのおかげで日本女性の守れる命が少しずつ増えてゆきます

2014年01月20日

### 子宮頸がんワクチンについて 14.01.20

子宮頸がんワクチン(HPV ワクチン)は、現在勧奨接種ではありませんが、

接種希望があれば、公費でうけることができます。

ワクチン接種後に問題となった神経症状は、

献血や BCG、DPT 接種などでも報告があり、

子宮頸がんワクチンに限ったことではありません。

「注射」という引き金が神経症状を引き起こしていると考えられます。

→ワクチンの成分が原因ではないと考えられます

クリニックでは、性交渉によって HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染が成立する前の接種を勧めます。

→性交渉によってウイルス感染が起こるため

ワクチン接種されても、性的活動性ある場合には、

定期的な “ 検診 ” も欠かさないようにする必要があります。

2013年06月19日

### 複合性局所疼痛症候群(CRPS)とは？ 13.06.19

子宮頸がんワクチンの接種後に問題となった 複合性局所疼痛症候群(CRPS)とはまだよく知られていません

ただ、子宮頸がんワクチンだけに限ったことではなく、

他のワクチン接種、献血、採血などでも起こることが報告されています

\* 日本の献血での健康被害報告にもこの 複合性局所疼痛症候群(CRPS) の記載があるようです \*

接種後の 複合性局所疼痛症候群(CRPS) については世界中で報告されていますが

自然発生のケースに比べて、発生頻度に差がないことから諸外国では接種中止にはなっていません

日本人だけの問題なのか？はこれからの調査結果次第ということになります

参考資料

(CRPSとは、

複合性局所疼痛症候群(ふくごうせいきよくしょうとうつうしょうこうぐん、英:Complex regional pain syndrome, 略称CRPS)は、交感神経の過剰な活性化に関っていると考えられる疼痛である。神経因性疼痛の代表的疾患であり、体性神経の損傷および骨・筋肉組織損傷、外傷(重症度は関係ない)、内臓疾患、中枢神経系損傷後に発症するとされるが、明らかな先行した損傷がなくとも発症することがある。また、感覚過敏・アロディニア・代謝異常・浮腫・腫脹・皮膚温異常・局所的骨粗鬆症など様々な症状が観察されることが多い。最も多発する部位は手であり、その場合は同側肩関節の運動制限を伴うことが多い。この病気は、難病指定はされていない。

**2013年06月17日**

**子宮頸がんワクチンの予防接種にあたって 13.06.17**

子宮頸がん予防ワクチン(サーバリックス、ガーダシル)について

厚労省より当面の間 勧奨接種を控えるように という指導がありました

今回問題となった「複合性局所疼痛症候群」については

その原因など詳細がよくわかっていません

クリニックでは、当初サーバリックス、現在はガーダシルを接種していますが、

詳細が判明するまで接種を控えさせていただきますが、

接種が再開された場合、接種間隔が空いたとしても、

接種を初めからやり直す必要はありません

→残った回数を接種することで可

→スケジュールが再開された場合 ( as soon as possible ),可能な限り残った回数をすみやかに接種する とされています

なお、女性特有の癌の家族歴がある場合

例えば アンジェリーナ・ジョリーさんのような乳がん家系 のように

子宮頸がんの家族歴があり、また性交前の女性であれば

接種することも可能です

(子宮頸がんを引き起こすパピローマウイルスは性交によって感染する)

子宮頸がんの家族歴があるならば、はじめての性交は

ワクチンの詳細が報告されるまで、しばらく待つようによく家族でも話あうのも良いでしょう。

厚労省のリーフレット



[\(PDF: 1378.83KB\)](#)

ニュース報道

[NHK](#)

[<子宮頸がん接種勧めず>医療現場混乱も 検討会採決は僅差](#)

厚労省の資料(ニュース報道前)

[子宮頸がん予防ワクチンの接種にあたって](#)

**2012年02月16日**

**[子宮頸がんワクチンで失神 12.02.16](#)**

\* 2月18日(土)は出張のため休診となります \*

子宮頸がんワクチン(サーバリックス)で接種後の失神について注意がありました

10万接種あたり8.17例の頻度で報告されています

ワクチン自体の問題というより、「血管迷走神経反射」～痛み、恐怖心、興奮などによりいわば“立ちくらみ”状態になるようです



15分以内で起こす例が7~8割

接種後は保護者の方が30分程度は付添をする必要があります

クリニックでも2人ほど失神の方がいましたが、ベット上での安静のみですぐに回復しています

PS)クリニックでは接種時に"ヤクルト"をプレゼントしています、接種後しばらく会計までの間ゆっくり休んでいただきます

**2011年12月16日**

### **子宮頸がんワクチン・3月以後も予算 OK11.12.16**

子宮頸がんワクチンやヒブワクチン・肺炎球菌ワクチンの公費助成が来年の3月で予算が途切れないか心配されていました

→この3種類のワクチン、実ははまだ定期接種ではないのです！（予算がなくなればすぐに自費に逆戻り😭）

「3ワクチンの助成継続に530億円 政府・4次補正予算案

政府が編成する今年度第4次補正予算案に含まれた厚生労働省関係経費の詳細が分かった。

過去の補正予算で対応している基金の積み増し・延長が中心で、子宮頸がんワクチンなど3ワクチンの接種を公費助成する特例基金の積み増しに530億円を充てる。4次補正予算案は早ければ16日にも閣議決定する。」

\* 中高生の女子で子宮頸がんワクチン受けていないかたは、安心して接種してください\*

追加の情報)

予算はつくのですが、、、、、、接種対象者がヒブ、肺炎球菌ワクチンが0~1歳、子宮頸がんワクチンが中学1年女子に限定されるそうです(早く定期接種化されるといいのに)

**2011年10月11日**

### **医師会より~子宮頸がんワクチン接種の勧め 11.10.11**

那覇市医師会より、子宮頸がんワクチン接種の"勧め"についての協力依頼がありました。

子宮頸がんワクチンは6ヶ月以内に3回の接種が望ましいとされており、9月までに受けていないと「来年3月までの公費負担」に間に合いません。

しかし、厚労省は現在「検討中」、那覇市医師会でも那覇市に対して「受診期間の延長」を陳情しているということです。

積極的にすすめるのは厳しいのですが、来年3月までは公費で接種できます。

また、インフルエンザワクチンと子宮頸がんワクチンの同時接種もうちのクリニックでは OK です。  
(同時接種の場合インフルエンザワクチン 1 回 3,000 円→2,500 円)

**2011 年 09 月 30 日**

### **子宮頸がんワクチンの国会審議 11.09.30**

子宮頸がんワクチンの予算措置が来年の 3 月で終了する予定です

しかし、国会でも来年 3 月以降も接種できるように女性議員を中心に審議がおこなわれているようです。

(→おまけでヒブワクチンや肺炎球菌ワクチンも、、、、)

“緊急措置”で導入された子宮頸がんワクチン、強い味方の議員のはたらきかけもあるのでおそらく延長もしくは制度化されるでしょう。

もし3月までに3回目がに接種できなくても、子宮頸がんワクチンは不活化ワクチンなので半年ほど期間があいてもそれほど効果は落ちません。(さすがに1年以上間隔が開くと効果は落ちます)

\* 理想的な接種; ACIP、3回目は6ヶ月以内に接種を!

スケジュールが遅れた場合(講演会メモ、野々山先生)

- \* 6ヶ月おきに接種3回までなら OK、遜色ない
- \* 1年おきに3回接種はさすがに効果が低下する
- \* 不活化ワクチン～早いよりは遅れたほうがまだ可

子宮頸がんワクチンは10月から3月までは確実に、無料で2回接種できます。

4月以降にはおそらく制度化、もしくは期間延長されてると思われます。

10月以降も、子宮頸がんワクチン・肺炎球菌ワクチン・ヒブワクチンは接種できるときに接種しておくことをお勧めします。

(インフルエンザワクチンと同時接種も可能です)

**2011 年 09 月 28 日**

### **ワクチン注射後の“失神”11.09.28**

子宮頸がんワクチン後に限らず、若い女性(中高生)で、注射・採血への緊張や、痛み、などにより失神することがあります。

～迷走神経反射～いわゆる「立ちくらみ」

子宮頸がんワクチンに限ったことではありません。

しかし、子宮頸がんワクチンは“筋肉注射で痛いよ～！”という学校でのウワサ話のため接種前から過剰に緊張している学生さんもいます(実際のところ痛みは個人差、痛みを感じない場合も多いのです)

注射・採血あとの失神は、思春期前後の若い女性で多いという報告もあります。

そのため接種後はしばらく、イスに座り安静にさせていただく必要があります。

接種・採血の場合には、初めから休める場所で接種・ベットの上で接種、、、などの配慮が必要になるのです。

追加)クリニックでは、待ってる間にヤクルトを1本おみやげとして渡してるのでちょっと休憩してってください。

(ヤクルトのおみやげは子宮頸がんのワクチンのみです、、、、他のちびっさんたちはう～ん残念🥲)

**2011年09月20日**

### **9月中旬に1回目接種を！子宮頸がんワクチン 11.09.20**

現在、中高生の女子を対象に子宮頸がんワクチン接種への助成が行われています。

来年3月までの予算なので、今月中に1回目を始めないと来年3月に間に合いません。

那覇市では、助成がはじまったのが6月であるため(西原などは1月)、医師会などから助成期間の延長を那覇市に要請しているところです。

まだ正式な返答がないためどうなるかは未定です。

(国も3月で打ち切り！っとはしないと思うのですが、、、、国会・政局次第です)

接種希望のあるかたはぜひ9月末までに1回目の接種を済ませておくといでしょう。

**2011年09月13日**

### **サーバリックスの副反応 11.09.13**

子宮頸がんワクチン、サーバリックスの副反応には主に、疼痛・発赤・腫脹などがあります。またほかにも疲労・筋肉痛・胃腸症状・関節痛・発疹・発熱・蕁麻疹などさまざまです。

副作用と副反応の違い；

副作用は、ある症状を治療するために投与したのに、目的ではない薬剤の作用が出た場合

副反応は、ワクチンを接種して免疫をつけることが目的だが、免疫をつける目的以外の作用がでてしまうこと

～DPT や肺炎球菌ワクチンなどで腫れやすいのもワクチンの効果を高める成分、アジュバント(アルミニウム酸塩)の影響があります～

今朝、でサーバリックス接種後 2 日後に亡くなられた 14 歳の子供さんの報道がありました(ご冥福をお祈りいたします)

基礎疾患 「VT、心室性不整脈」の持病があったことによる不整脈が死因だと推定されたようです。

接種後の死亡は世界でも数例(5例)ですが、ワクチンがはっきりした原因の死亡例はありません。

子宮頸がんを減少させる効果はあるのですが、このような出来事は今後も起こりうるでしょう。

やはり、

- 1 手厚い補償制度をつくること(&無過失補償制度)
- 2 ワクチンの副反応などの情報を(もっと)わかり易く公開すること

この2つをぜひ国にお願いしたいものです。

**2011 年 08 月 26 日**

### **子宮頸がんワクチン ガーダシル 11.0826**

8 月 25 日に厚労省より各都道府県に子宮頸がんワクチンの追加(ガーダシル)の通達が出されています。

子宮頸がんワクチンには二種類あります。

サーバリックス;グラクソ・スミスクライン社製、2 価ワクチン、世界シェアの 2 割

ガーダシル;MSD 社製、4 価ワクチン(尖圭コンジローマにも有効)、世界シェアの 8 割  
(ただし、県が使用を認めた場合、最短で 9 月 15 日以後)

なぜ、世界シェア 8 割のワクチン導入が遅れたのか？

なぜ、データや効果など資料があるワクチンの導入が遅れたのか？

本当の理由がよく解りません(天下りの有無、新型インフルエンザワクチン無償引取り、価格交渉、、、、オトナの都合)

ガーダシルは、子宮頸がんのみでなく(男女の)尖圭コンジローマを予防→さらには新生児の「再発性呼吸器乳頭腫症」という難治性の病気も予防します。

クリニックとしては、ガーダシルを使用したいのですが、ワクチンの助成が来年 3 月までです。

これが延長されない限り使用することは今のところ難しい状況にあります。

**2011年08月23日**

**子宮頸がんワクチン 接種間隔、失神など 11.08.23**

現在、中学高校生の女兒(対象者のみ)に子宮頸がんワクチンの案内がきていると思います。

現在使用可能なワクチン(行政の補助がでるワクチン)はサーバリックスのみですが、もしかするとガーダシルという種類も使用可能になります。

このサーバリックス、アジュバンドといってワクチンの効果を高める成分が使用されています。

ワクチンの効果を高める働きもあるのですが、、、、副反応として少々腫れたり、発熱がみられるのです。

筋肉注射なので、接種した日～翌日に痛みがみられ腕があがりにくくなったよ～っということも時にみられます。

ただ、女性の大敵～子宮頸がんを予防～するのでここは頑張って接種してください。

“アジュバンド”のおかげで少々スケジュールが遅れても効果はあります。

不活化ワクチンなので、早く接種するよりはやや遅れても効果が認められるのです。

(ワクチンへの助成が来年度分3月以後、まだ決まってないので、希望のかたは9月までに接種を！)

“注射への恐怖心や痛みから”失神を起こすケースも報告されてます。

～血管—迷走神経反射～いわゆるたちくらみ状態

15分程度は接種のあと安静にしてください。

子宮頸癌ワクチンを接種した場合、クリニックから“ヤクルト”を1本プレゼントしているので、飲みながら一息つくといでしょう！(現在は残念ながら、、プレゼント無しになってます(;\_))

**2011年08月02日**

**子宮頸がんワクチンの接種は 9月までに！ 11.08.02**

\*8月12日、13日は学会出張のため休診となります\*

子宮頸がんワクチン(サーバリックス)の接種は3回です。

2回目は1ヶ月あけて、2回目からは5ヶ月あけての接種

ところが、ワクチンへの接種費用助成は来年の3月までなので、、、、

9月中旬に1回目を接種しておかないと、来年の3月までに終わりません。

国会で費用など助成・制度の変更を決めない限り、3月以降の接種については自己負担ということになります。

まさか、そんなことはないだろうと思うのですが

子宮頸がんワクチンの接種を希望する中高生は、9月までにまず1回目を受けるようお願い致します。

**2011年07月05日**

### **子宮頸がんワクチンのワクチン取り寄せ 11.07.05**

子宮頸癌ワクチンの取り寄せができるようになるようです。(7月10日より、メーカーからの案内)

しかし、週単位で数本ずつの取り寄せしかできません。

市町村から接種の案内が来ても、まず病医院に予約が必要になります。

(すぐには接種できません)

ワクチンメーカーは、高校1年～2年の分しか配給できないようです。

すぐに接種はできない可能性がありますが、子供さんと頸がん、SEXなどについて話あうよい機会になればよいかと思えます。

一度子宮頸がんワクチンについても調べてみるとよいでしょう。(メリット VS デメリット)

**2011年04月12日**

### **新しいワクチンの助成開始は 6月と決定 11.04.12**

\* 携帯・パソコンから再診予約すると、おおよその待ち時間がわかります。「WEB 順番受付け」はこちら→

<http://fco.mdja.jp> \*

那覇市の肺炎球菌ワクチン・ヒブワクチンの助成開始が**6月1日**より、

子宮頸がんワクチンの助成開始が**7月**と正式に決定しました。

4月に説明会があるため、5月開始と思っていたのですが、、、、、、さらに遅れるようです。

→“5月から”と説明した保護者のかたには申し訳ありませんでした。

市民への周知、広報(チラシ)等、実施医療機関の把握なども行う必要があるためのようです。

～1月から始まっている自治体もあるのですが、2年間限定の予算措置が切れる1年半後には助成なくなります🙄～

**2011年03月08日**

### **子宮頸癌ワクチンは、7月まで入荷できません 11.03.08**

子宮頸がんワクチン(サーバリックス)が品不足になり、7月まで一般のクリニック・診療所では手に入らなくなりました。

全国でも、このこのワクチン接種費用の補助が始まり希望者が増えたためです。

正確には、希望者が増えることを見越して薬品会社が十分な輸入をしていなかった、、、、のが原因だと思います。

ただし、すでに1回～2回接種の方には優先して配給することは可能なようです。

接種費用の補助は2年間限定(の予定)、今後期間が延長されるのかはまだ不明な状態になっています。

那覇市も5月からの予定でしたが、さらにずれ込むでしょう。

そうすると実質補助のある期間は1年ちょっと?ということもあり得ます。

1月から開始している自治体と比べると大分差がでてくるかもしれません。

**2010年10月12日**

### **新しいワクチンに補助の閣議決定 10.10.12**

先日、子宮頸がんワクチンやヒブワクチン、肺炎球菌ワクチンへの補助金が閣議決定されたという報道がありました。

補助金と言っても、全額国が負担するものではありません。

地方の市町村が半分程度負担する必要があります。

→国の決定から→市町村へ降りてきて→細かな調整/予算調整など→ その他 を考えると

実施されるのは、大分先の話になるでしょう。

ヒブワクチンや肺炎球菌ワクチンの特に必要な年齢は生後2ヶ月から2歳です。

補助を待たないで接種をお願いしたいのです。

追加)

うれしい報道なのですが、???な部分も多くあるのです。

使われなかった新型インフルエンザワクチンを製薬会社がひきとる代わりに子宮頸がんワクチンの補助を決めたのではないか？ 新しく導入されたワクチンにあまりに早く補助つけるのはおかしい？

昔から行われているおたふく風邪ワクチン、や水痘ワクチンには何故補助つかないのか？

このあたりの(正しい)状況を知りたいものです。

**2010年04月22日**

### **子宮頸がんワクチン 10.04.22**

子宮頸がんと診断される女性は年間1万5千人、20-30歳代の女性にふえつつあります。

子宮頸がんは「ヒトパピローマウイルス HPV」の感染が原因です。

女性の8割は性交渉により一度は感染し、大半は自然消滅します。

ただ、感染が長引くとがんに進行することがあるのです。

子宮頸がんは「唯一予防できるがん」と呼ばれています。

性交渉が始まる前にワクチンを接種して、感染を予防することが望まれています。

接種対象は9歳から26歳の女性が対象です。

ただ、このワクチンも任意接種(自己負担)で、半年に3回の接種が必要ですが、高額なため国や自治体による助成が必要とされています。(当クリニックでは、1回15750円となります)

佐賀県小城市、東京渋谷区、名古屋市などでは中学生を対象に助成をはじめています。

那覇市も「国の動向を踏まえて検討したい」と現時点では慎重姿勢のよう